

## ROSA FARINOSA.

*R. sylvestris alba uniformi, pedunculataque superne glabra; foliis ovalibus utrinque villosis; mollissimis, duplicato-serratis; paniculis tomentosis caulibus aculeatis; aculeis recurvatis.* RAV. En. Ros. p. 147. RED. Roses, vol. 2, p. 40. TAY. Prod. groupe XI. Spec. 23.

## LE ROSIER FARINEUX.

## DESCRIPTION.

Arbusteau très-rameux qui s'élève le plus souvent à trois pieds, ou environ, mais quelquefois jusqu'à cinq. Ses tiges sont armées d'aiguillons fermes et presque droits. Les rameaux et les ramuscules de l'année sont munis d'autres aiguillons plus petits, un peu défilés; leur sommet est presque glabre. Les feuilles se composent de trois, cinq, assez rarement de sept folioles, les unes pointues, les autres obtuses au sommet, couvertes, sur les deux faces, d'un duvet blanchâtre, molles au toucher, doublement dentées, à dentelures ciliées et glanduleuses: elles sont garnies à leur base de stipules lanceolées, pointues glabres en-dessus, munies en-dessous de glandes et de poils très-rapprochés, denticulées en leur bord. Les fleurs, terminales, se réunissent en une espèce de corymbe à l'extrémité des rameaux: les pédicelles qui les supportent sont glabres à leur partie supérieure, et pubescents inférieurement. Les tubes ovaires des calices sont entièrement glabres. Les bractées qui accompagnent les pédicelles sont ciliées et gar-



Rosa farinosa.

P.L. Redouté pinx.

Imprimerie de Bouché.

Rosier farineux.

Viret sculp.

